

徐氏醫學十六種


4



Chinese

Vol. IV.

4



序

王叔和傷寒例云今搜採仲景舊論錄其證候診脈聲色對病真方擬防世急則知傷寒論當時已無成書乃叔和之所搜集者雖分定六經而語無詮次陽經中多陰經治法陰經中多陽經治法夾錯不一後人各生議論每成一書必前後更易數條互相訾議各是其說愈更愈亂終無定論不知此書非仲景依經立方之書乃救誤之書也其有序云傷寒橫之莫救所以尋求古訓博採眾方蓋因誤治之後變證錯雜必無循經現證之理當時著書亦不過隨證立方本無一定之次序也余始亦疑其有錯亂乃探求三十年而後悟其所以然之故於是不類經而類方蓋方之治病有定而病之變遷無定知其一定之治隨其病之千變萬化而應用不爽此從流溯源之法病無遁形矣至於用藥則各有條理解肌發汗攻邪散痞逐水驅寒溫中除熱皆有主方其加減輕重又各有法度不可分毫假借細分之不外十二類每類先定主方即以同類諸方附焉其方之精思妙用又復一一註明條分而縷悉之隨以論中用此方之證列於方後而更發明其所以然之故使讀者於病情藥性一目了然不論從何經來從何經去而見證施治與仲景之意無不吻合豈非至便之法乎余纂集成帙之後又復鑽窮者七年而五易其稿乃無遺憾前宋朱肱活人書亦曾景治法於方後但方不分類而又無所發明故閱之終不得其要領此書之成後之讀傷寒論者庶可以此為津梁乎

乾隆二十四年歲在屠維單閼陽月上浣涇溪徐大椿序

傷寒論類方目錄

桂枝湯類一計九

桂枝湯

桂枝加附子湯

桂枝加桂湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝加厚朴杏仁湯

小建中湯

桂枝加芍藥生薑人參湯參新

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝加葛根湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

麻黃湯類二計

麻黃湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

太青龍湯

小青龍湯

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

葛根湯類三計

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

葛根加半夏湯

柴胡湯類四計

小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡加桂枝湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡加芒硝湯

梔子湯類五計

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子乾薑湯

梔子厚朴枳實湯

梔子柏皮湯

枳實梔子豉湯

承氣湯類六十一

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃仁承氣湯

抵當湯

抵當丸

十棗湯

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

白散

麻仁丸

瀉心湯類七十二

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

半夏瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

黃連湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

乾薑黃連黃芩人參湯

旋復代赭石湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

白虎湯類八十三

白虎湯

白虎加人參湯

竹葉石膏湯

五苓湯類九十四

五苓散

猪苓湯

文蛤散

茯苓甘草湯

四逆湯類十十五

四逆湯

四逆加人參湯

通脈四逆湯

通脈四逆加猪膽汁湯

乾薑附子湯

茯苓四逆湯

白通湯

白通加豬膽汁湯

四逆散

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

理中湯類十一方

理中丸

真武湯

附子湯

甘草附子湯

桂枝附子湯

桂枝附子去桂加白朮湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

桂枝人參湯

雜方十二方

赤石脂禹餘糧湯

炙甘草湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

茵陳蒿湯

麻黃連軀赤小豆湯

瓜蒂散

麻黃升麻湯

黃連阿膠湯

吳茱萸湯

半夏散及湯

桃花湯

豬膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒散

烏梅丸

白頭翁湯

牡蠣澤瀉散

蜜煎導方

豬膽汁方

燒視散

以上共一百十三方

傷寒論類方

吳江徐大椿靈胎編輯

桂枝湯類一

桂枝湯一

桂枝三兩兩芍藥三兩兩甘草二兩兩生薑三兩兩太棗十二枚枚右五味以水七升微火煮取三升去滓適寒溫

服一升服已須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力桂枝本不能發汗故須助以熱粥內經云穀入於胃以

觀此可知傷寒溫覆令一時許遍身熱熱微似有汗者益佳不可令如水淋漓病不必除此解肌之法也

動榮氣衛邪仍在若一服汗出病瘥停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促其間半日許令

三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出乃服至二三劑

湯全料謂之一劑三分之一謂之一服古一兩今二錢零則一劑之藥除薑棗僅一兩六錢零一服不

過五錢零矣治傷寒大症分兩不過如此一服即汗不再服無汗服至二三劑總以中病為主後世見

服藥得效者反令多服無效者即禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪及臭惡等物

太陽中風陽浮而陰弱風在外故陽脈浮衛氣有陽浮者熱自發桂枝之辛以散之陰弱者汗自出

以收之甘草當啗惡寒漸惡風惡風未有惡寒者但惡寒甚翕翕發熱其熱亦不如鼻鳴乾嘔者太

似屬陽明乾嘔似屬少陽蓋三桂枝湯主之太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之太

陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法治若不上衝者不可與之此誤下之症誤下而仍上衝

湯則愈。此非誤治因風邪凝結於太陽之要路則藥力不能流通故刺以解其結蓋邪風太甚不僅在衛而在經刺之以洩經氣風府一穴在項上入髮際一寸大筋內宛宛中督脈陽維之會也刺入四

分留三呼風池二穴在顛顛後髮際陷者中足少陽陽維之會針入三分留三呼 太陽病外症未解脈浮弱者當以汗解宜桂枝湯。病雖過期

陽仍不離桂枝法 太陽病外症未解者不可下也。此禁下下之為逆欲解外者宜服言雖有當下之症而外症未除亦不可下仍宜解外

而後 太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮為在外而反下之故令不愈令脈浮故知在外當須解外則愈宜服。脈浮而下此為誤下下後仍浮則邪不因誤下而陷入仍在太陽不得因已汗下而不復用桂枝也 病嘗自汗出者此為榮氣和榮氣

和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故爾。榮氣和者言榮氣不病非調和之故又申言之 以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮

衛和則愈宜桂枝湯。自汗與發汗迥別自汗乃榮衛相離發汗使榮衛相合自汗傷正發汗驅邪復發者因其自汗而更發之則榮衛和而自汗反止矣 病人藏無他病

時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯主之。無他病太陽諸症不必備而惟發熱自汗故亦

用桂枝湯 傷寒不大便六七日。宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯。太陽症仍在不得以日久不便而下也按未可二字從金匱增入傷寒論失此二字

其小便清者知不在裡仍在表也。裏有熱當須發汗若頭痛者必衄汗出而頭痛未解則宜桂枝湯 傷寒發汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗。發汗未透故煩乃 宜桂枝湯。傷寒醫下之續得下利清

穀不止。裏 身疼痛者。表 急當救裡。此誤下之症邪在表而引之入陰故便清穀陽氣下脫可危雖表症未

膿 後身疼痛清便自調者急當救表。清穀已止疼痛未除仍從表治蓋凡病皆當先表後裏惟下利清穀血後身疼痛清便自調者急當救表則以扶陽為急而表症為緩也表裏分治而序不亂後人欲以一方

治數症必至而誤 救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯。太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風者

宜桂枝湯。提出邪風二字見桂枝為驅風聖藥 陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜此方。陽明本自多汗但不惡寒而惡

熱今多汗而猶惡寒則仍在太陽 太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯。太陰本無汗法因其脈獨浮則邪仍

陽矣雖陽明病而治從太陽

病人煩熱汗出則解。又如瘧狀。有時復熱日晡所發熱者屬陽明也。日晡發熱則為陽明。脈實者宜下之。脈虛

浮者宜發汗。一症而治法迥別。全以脈為下之。與大承氣湯發汗。宜桂枝湯。下痢腹脹滿。裏身疼痛者。

表先溫其裡。乃攻其表。溫裡宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。此節屬厥陰症。未必由誤治。下痢腹脹滿。裏身疼痛者。

休者當消息和解其外。宜桂枝湯。小和之。裏症除而表症猶在。仍宜用桂枝法。輕其劑而加減之可也。

痞。如入惡寒者。表未解也。不可攻痞。當先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連瀉心湯。

苦寒開降之法詳見後

桂枝加附子湯二

桂枝湯原方加附子一枚炮去皮破八片。右六味以水七升。煮取三升。去渣溫服一升。

太陽病發汗遂漏不止。此發汗太過如水流。其人不惡風。中風本惡風。汗後當愈。今小便難。津液四肢微急。

難以屈伸。四肢為諸陽之本。急難屈伸乃津脫陽虛之象。但不至亡桂枝加附子湯主之。則能止汗。回陽。

桂枝加桂湯三。桂枝原方加桂二兩。即另立湯名。治症迥別。古聖立方之嚴如此。

桂枝湯原方加桂二兩。右五味以水七升。煮取三升。去渣溫服一升。

燒針令其汗。針處被寒。復感新寒。核起而赤者。必發身。脈氣從小腹上衝心者。灸其核上。各一壯。云各一針。故

與桂枝加桂湯。重加桂枝。不特禦寒且制腎氣。又藥味重。則能達下。凡奔豚症此方可增減用之。

桂枝去芍藥湯四

桂枝湯原方去芍藥。右四味以水七升。煮取三升。溫服一升。

桂枝去芍藥加附子湯五

即前方加附子一枚炮去皮破八片餘依前法

太陽病下之後脉促胸滿者中虛而表邪仍在桂枝去芍藥湯主之太陽之邪未盡故用桂枝下後傷陰不宜更用涼藥若微惡寒者去芍

藥方中加附子湯主之微惡寒者則陽亦虛矣故加附子

桂枝加厚朴杏仁湯六

桂枝湯原方加厚朴二兩炙杏仁五十枚右七味以水七升微火煮取三升溫服一升覆取微似汗

喘家作桂枝湯加厚朴杏仁佳別錄厚朴主消痰下氣木經杏仁主咳通上氣太陽病下之危喘者表未解故也此湯主之前條

乃本然之喘此乃誤下之喘因殊而法一

小建中湯七

桂枝湯原方加膠飴一升右六味以水七升煮取三升去滓納飴更上微火消解溫服一升日三服

嘔家不可用建中湯以甜故也

傷寒陽脉濡陰脉弦中宮之陽氣虛則木來法當腹中急痛先與小建中湯以助中宮不差者與小柴胡

湯主之治太陰不愈變而治少陽所以疎土中之木也以脉弦故用此法傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之悸而煩其為虛煩可知故用建

中湯以補心脾之氣蓋梔子湯治有熱之虛煩此治無熱之虛煩也

桂枝加芍藥生薑人參新加湯八

桂枝湯原方芍藥生薑各增一兩加人參三兩右六味以水一斗二升煮取三升去滓溫服一升此

多前為其味厚入陰也

發汗後身疲痛盡未去脉沈遲氣虛此湯主之用參人參凡素體虛而過汗者方可用

桂枝甘草湯九

桂枝四兩甘草二兩

右二味以水三升煮取一升頓服此以一副

發汗過多其人入手自冒心下悸欲得按者此湯主之發汗不誤在過多汗為心之液多則心氣虛

鮮地則用真武湯矣一症而輕重不同用方迥異其義精矣

茯苓桂枝甘草大棗湯十

茯苓半斤桂枝四兩甘草二兩大棗十二枚

右四味以甘爛水一斗以水二斗揚之為通取用按甘先

者茯苓凡方中專重之減二升納諸藥煮取三升去渣溫服一升日三服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚此湯主之心下悸是提胸中之陽臍下悸則因發汗太過上焦乾渴腎水上救故重用茯苓以制腎水桂枝以治奔豚

桂枝麻黃各半湯十一

桂枝一兩十六分芍藥一兩十六分生薑一兩甘草炙麻黃去節各一兩大棗四枚杏仁二十四枚

右七味以水

五升先煮麻黃一二沸去上沫故先煮納諸藥煮取一升八合減去三之一去滓溫服六合一云桂枝湯三

合麻黃湯三合頓服將患如上法

太陽病得之八九日經如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不可嘔非少清便欲自可一日二三度

發非瘧脈微緩者弦不大為欲愈也餘邪欲退之象脉微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也此三

明上文微愈之故益由病氣雖除而正氣亦衰當靜以養之使胃氣漸充則
榮衛自和若更用汗吐下之法益虛其氣則病從藥增醫者不審誤人多矣面色反有熱色者未欲解也
面有熱色則以其不得小汗出身必痒宜服微和已在皮膚中欲自出不得故身痒以此湯取其小汗足
方分兩其鹽計共約六兩合今之秤僅一兩三四錢分
三服祇服四錢零乃治邪退後至輕之劑猶勿藥也按此

桂枝二麻黃一湯十二

桂枝一兩十七芍藥一兩杏仁十六枚麻黃十六枚甘草二兩生薑一兩大棗五枚右七味以水五升

先煮麻黃二沸去上沫納諸藥煮取二升去滓溫服一升日再服一本云桂枝湯二升麻黃湯一升
合為三升分再服

服桂枝湯大汗出脈洪大者汗雖出而邪未盡與桂枝湯如前法此所謂初不盡復如法者也若形如瘧日再發者汗出必解

桂枝二麻黃一湯主之此與桂枝湯麻黃各半湯意略同但此因

桂枝二越婢一湯十三
桂枝湯加麻黃石膏二味

桂枝去皮芍藥 甘草 麻黃去節大棗四枚生薑二兩石膏二十四枚碎綿裹 右七味以水五升

煮麻黃二沸去上沫納諸藥煮取二升去渣溫服一升 附越婢方 麻黃六兩 甘草二兩 石

羔半兩 生薑三兩 大棗十五枚

大陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可更汗此與陽與亡陽不同并與他處之陽虛亦別

而脈微弱若發其汗必至有以手冒心膈下悸等症故以此湯清疎榮衛令得以汗而解况熱多寒少熱
在氣分尤與石羔為宜古聖用藥之審如此 按以上三方所謂一二名半之說照方計算並不對準未
如何說或云將本方各前或一分或二分相和服
此亦一法但方中又各註注明分而則何也存考

桂枝去桂加茯苓白朮湯十四

芍藥三兩 甘草二兩 生薑

茯苓

白朮各三兩

大棗枚十二

右六味以水八升。煮取三升。去滓溫

服一升。小便利則愈。此方專於利小便也

服桂枝湯。或下之。仍頭頂強痛。翕翕發熱無汗。下滿微痛。小便不利者。此湯主之。頭痛發熱。桂枝症。仍宜更用桂枝。心下滿。則用白朮。小便不利。則用茯苓。此症乃亡津液。而有停飲者也。凡方中有加減法。皆任使之藥。若去其君藥。則另立方名。今去桂枝。而仍以桂枝為名。所不可解。殆以此方雖去桂枝。而意仍不離乎桂枝也。

桂枝湯方。藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯十五

桂枝湯原方。去芍藥。加蜀漆三兩。洗牡蠣五兩。龍骨四兩。

右七味以水一斗二升。先煮蜀漆減二升。

納諸藥。煮取三升。去滓溫服一升。

傷寒脈浮。醫以火迫劫之。亡陽。必驚狂。以火劫其胸中之陽。起臥不安者。此湯主之。此與少陰汗出之亡陽迥別。蓋用四逆散。固其陽於腎中。今乃以火逼汗亡其陽中。之陽故用安神之品。鎮其陽於心中。各有所宜。理不可易也。去芍藥。因陽虛不復助陰。見其陽去。心腹和。蒼龍平。後時治驚。病瘳氣。

桂枝甘草龍骨牡蠣湯十六

桂枝一兩 甘草二兩 牡蠣二兩 龍骨二兩

右四味以水五升。煮取二升半。去渣溫服八合。日三服。

脈浮宜以汗解。此治脈浮之總訣用火灸之。治邪無從出。因火而盛。入厥病從腰以下。必重而痺。名火逆也。火熨

則陰氣獨治於火逆下之。誤因燒針煩躁者。更誤治下之。虛其陰。燒針又益其煩躁。不宜矣。桂枝甘草龍骨牡蠣湯

主之。錢其陰氣散其火邪。上下同治。前方驚狂治重在心。故用蜀漆。此無驚狂。故蜀漆不用。其症藥大段相同。

傷寒論類方 桂枝湯

桂枝加葛根湯十七 此湯成與已本有麻黃非有麻黃則為葛根湯矣

桂枝湯原方加葛根四兩桂枝芍藥各減一兩餘同右六味以水一斗先煮葛根減一升去上沫納

諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥

太陽病項背強八反汗出惡風者八八仲頸之象邪氣漸深故加葛根桂枝加葛根湯主之

桂枝加芍藥湯十八

桂枝湯原方芍藥加一倍右五味以水七升煮取三升溫服一升日三服

桂枝加大黃湯十九 此二方俱治太陰症而法不離乎桂枝

桂枝湯原方加大黃一兩芍藥一倍右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

本太陽病醫反下之瀉因而腹滿時痛屬太陰也引即入於太陰故桂枝加芍藥湯主之雖見太陰症而未

罷效仍用桂枝湯只加芍藥一倍以飲太陰之症大實痛者此句承上文腹滿時痛言腹滿時痛不過桂枝加太黃湯主之此因

而見太陰之症大實痛則反成太陰之實初仍用大黃引之即從太陰出不因誤下而禁下見症施治無

不盡然按活人書云桂枝湯自西北人四時行之無不應驗江淮間惟冬及春可行之春末及夏至以

麻黃湯類二

麻黃湯一

麻黃三兩桂枝二兩甘草炙一兩杏仁七十個右四味以水九升先煮麻黃減二升此須多煮取其力

上有一去上沫納諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥以其易發汗也餘如桂枝將息法

活人書云夏至後用麻黃湯量加知母
黃芩蓋麻黃性熱恐有發黃斑出之慮

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛此痛處比桂枝症尤多而惡風無汗而喘者此二症乃肺氣不舒

仁治喘桂枝甘草治太陽諸症無一味不緊切所以謂之經方太陽與陽明合病陽明之病象甚多如身熱不惡寒口苦鼻乾之類但

喘而胸滿者不可下病便在上宜麻黃湯主之而胸滿此麻黃症見一二症即是不必全具也太陽病即上文所指者

嗜臥者止漸復外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯胸滿脇痛病延日久脈但浮者與麻黃湯若果邪在

帶弦今但浮則尚在太陽矣故仍用麻黃湯此亦從肘不從症之法太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛此乃太陽傷寒的八九日不解表

證仍在文証即上此當發其汗宜麻黃湯服藥已微除其人發煩目瞑陽鬱而不劇者必衄衄乃解其動血

清道而出與汗從皮毛而洩同故熱邪亦解俗語所云紅汗也經云陽明病口燥但欲漱水不欲咽者此必衄所以然者陽氣重故也內經云數病者皆傷寒之

類麻黃湯主之此言未衄之前可用麻脈浮者病在表可發汗宜麻黃湯此脈浮必帶緊脈浮而數者發

汗宜麻黃湯數為陽氣欲出傷寒脈浮緊不發汗治因致衄者麻黃湯主之前段衄後而解則不必復用麻

陽明病汗浮無汗而喘者陽明本脈大自汗今乃脈浮發汗則愈宜麻黃湯黃衄後尚未解則仍用此湯

麻黃杏仁甘草石膏湯二加杏仁也

麻黃四兩杏仁五十個甘草二兩石膏半斤右四味以水七升先煮麻黃減二升去沫納諸藥

煮取二升去滓溫服一升

發汗後不可更行桂枝湯就汗不可再汗津液不得重傷汗出而喘尚有留邪在肺無大熱者輕也可與此湯汗出故用

用麻發汗後飲水多者必喘此二句明致喘之所由蓋喘未必皆下後不可更行桂枝

湯既下不可復汗若汗出而喘無大熱者可與此湯

大青龍湯三此合麻黃桂枝越婢三方為一方而無芍藥

麻黃六兩桂枝二兩甘草二兩杏仁四十枚生薑切三兩大棗十二枚石膏碎如雞子一塊右七味以水九升

先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉撲之此外治之法論中無

溫粉方明理論載白朮藥本川芎白芷各等分入米粉和勻撲之無藥本亦得後人用牡蠣麻黃根鉛粉龍骨亦可

不得眠也

太陽中風脈浮緊汗為陰脉故發熱惡寒非惡身疼痛不汗出而煩躁者邪鬱大青龍湯主之若脉微弱

汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也惡風乃桂枝症誤服此則汗不止而有亡陽之象矣立此方即要此戒聖人之意深矣按此方合

麻桂而用石羔何以發汗如是之烈蓋麻黃湯麻黃用二兩而此用六兩越婢湯石羔用半兩而此用雞子大一塊一劑之藥除大棗約共十六兩以今秤計之亦重三兩有餘則發汗之重劑矣雖少加石羔終

不足相制也少陰篇云脉傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰症者大青龍湯主之脉不

陰陽俱緊反汗出者亡陽也身有輕時為無少陰外症不厥利吐逆為無少陰裏症此邪氣俱在外也故以大青龍發其汗按此條

必有誤脉浮緩邪輕易散身不疼外邪已退乍有輕時病未入陰又別無少陰等症此病之最輕者何必

投以青龍險峻之劑此必另有主方而誤以大青龍當之者也

小青龍湯四

麻黃去節芍藥 細辛 乾薑 甘草 桂枝去皮各五味子半兩半夏半升右八味以

水一斗先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升若微利者去麻黃加薤花如雞子大熬令赤色利屬下焦陰分不可更發其陽薤花明理論作薤花恐誤本草薤花薤花若渴者去

半夏加括葉根三兩

本草括葉根主消渴

若噎者

噎古作餉論云寒氣相搏則為腸鳴醫乃不知而反飲冷水令

汗大出水得寒氣冷必相搏其人即餉

按內經無噎字疑即

輕者去麻黃加附子一枚炮本草附溫中若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩則水不在上而在下

矣故用

若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖

杏仁見前

按此方專治水氣蓋汗為水類肺為水源和

此方與微不

到真神劑也

傷寒表不解

發汗未透

心下水氣

即未出

乾嘔發熱而咳或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青

龍湯主之

以上皆水停心下現症其

傷寒心下水氣

欬而微喘發熱不渴

凡水停心下

服湯已即小青龍

也

渴者此寒氣欲解也

建微小

青龍湯主之

此倒筆法即指服湯已三字非

謂欲解之後更服小青龍湯也

麻黃附子細辛湯五

麻黃二兩

細辛二兩

附子一枚

右三味

先煮麻黃減二升去上沫

納諸藥煮取三升

去滓溫服

一升日三服

少陰病始得之反發熱

脈沉者此湯主之

少陰病三字所該者廣必從少陰諸現症細詳審然後反發

熱知為少陰之發熱否則何以知其非太陽陽明之發熱耶又

必候其脈象之沈然後益知其為少陰無疑也凡審症皆當如此

附子細辛為少陰溫經之藥夫人知

之用麻黃者以其發熱則邪猶連太陽未盡入陰猶可引之外達不用桂枝而用麻黃者蓋桂枝表裏通

用亦能溫裏故陰經諸藥皆用之麻黃則專於發表今欲散少

陰始入之和非麻黃不可況已有附子足以溫少陰之經矣

麻黃附子甘草湯六

麻黃二兩

甘草二兩

附子一枚

右三味

以水七升

先煮麻黃兩沸

去上沫

納諸藥煮取三升

去渣溫服一升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏症故微發汗也

三陰經惟少陰與太陽為

表裏而位最近故猶有汗

傷寒論類方

葛根湯

六

解之理凡二三日而無震症則其邪未深入此方較麻黃附子細辛少輕以其無震症也

葛根湯類三

葛根湯一 此即桂枝湯加麻黃三兩葛根四兩

葛根 四兩 麻黃 三兩 芍藥 二兩 生薑 五兩 甘草 二兩 桂枝 二兩 大棗 十二枚

右七味以水一斗先煮麻

黃葛根 二味 減二升去上沫納諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥汗能發餘如

桂枝法將息及禁忌

大陽病項背強凡凡無汗惡風葛根湯主之 之前桂枝加葛根湯一條其現症亦同但彼云反汗出故無麻

惡風則未全入陽明故曰太陽病按葛根本草治身大熱大熱乃陽明之症也以太陽病入陽明之經故加此藥 太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之也

此蓋風邪入胃則下利矣

葛根黃芩黃連湯二

葛根 半兩 甘草 二兩 黃芩 三兩 黃連 三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升納諸藥煮取二升去

渣分溫再服

太陽病桂枝症 桂枝症即太陽病 醫反下之 大誤利遂不止 利無止時 脈促者表未解也 促有數意邪猶在外

沈微等象故不用理中法 喘而汗出者此湯主之 因表未解故用葛根因喘汗而利故用芩連之 苦以視之堅之 芩連甘草丸治痢之主藥

葛根加半夏湯三

葛根湯原方加半夏半斤先煎服法同

大陽與陽明合病不下利 前條因下利而和太陽陽明合病今既不下利則合病何從而但嘔者葛根加

半夏湯主^{前條太陽誤下而成利則用苓連治利因其本屬桂枝症而脈促故止加葛根一味以解陽}
^{明初人之邪此條乃太陽陽明合病故用葛根湯全方因其體嘔加半夏一味以止嘔隨病}
^{立法各}

柴胡湯類四

小柴胡湯一

柴胡^{半助} 黃芩^{人參}

甘草^炙

生薑^兩

半夏^{半助} 大棗^{十二}

右七味以水一斗二升煮

取六升去渣再煎一^此取三升溫服一升日三服^{此湯除大棗共二十八兩較今秤亦五兩六錢零雖}

^{經故藥不宜輕去渣再煎者此方乃和解之劑再煎則藥性和合能}使經氣相融不復往來出入古聖不但用藥之妙其煎法俱有精義

^{煩不可用人參}加括蕞實一枚^{括蕞實除胸痹此}若渴者去半夏^{半夏能滌痰瀝}加人參^{生津}金剛

成四兩半括蕞根四兩^{治消}若腹中痛者去黃芩^{若加芍藥三兩除腹}若脇中痞硬去大棗^{以其能}加

牡蠣四兩^{別錄云治}若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩^{便小}若不渴外有微熱者去人參^渴

^{則津液}加桂枝三兩^{微熱則和}溫覆取微似汗愈若欬者去人參大棗^{二味與}生薑^{加乾薑故}加五味

子半升乾薑二兩^{古方治嗽五味乾薑本同用一以散寒邪一以飲正氣從無單用五味治嗽之法後}

^{收飲風火痰涎深入肺藏永難療矣}又按小柴胡與桂枝二方用處

傷寒五六日^{正當傳少}中風往來寒熱^{太陽之寒熱寒時亦熱熱時亦寒}胸脇苦滿^{胸脇為少}默默不欲

飲食^{木和}心煩喜嘔^{木逆}或胸中煩而不嘔^{或渴}或腹中痛^{木克}或脇下痞硬^{填鬱}或心下悸^{有痰}

小便不利^{或不渴}身有微熱^{少陽}或欬者^{肺有}此湯主之^{少陽所現之症甚多柴胡湯所治}血弱

傷寒論類方

柴胡湯

氣盡腠理開如氣因入與正氣相搏結於腦下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食藏府相連其痛必下和高痛下故使嘔也此條申明所以往來寒熱及不欲食下痛上嘔之故皆服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之此必先見少陽之症故用柴胡

傷寒四五日身熱惡風頸項強此是大腸下滿此則少陽所屬手足溫而渴者前條之陽明此因腸下小柴胡湯主之傷寒陽脈濡陰

脈弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者與小柴胡湯主之此類中傷寒中風有柴胡症但見一證

便是不可悉具此可據雖有他証可兼治矣凡柴胡湯病證而下之緣若柴胡證不罷者復與柴胡

湯凡誤治而本証未罷仍用本証必為善而振却發熱汗出而解却已陷下故必振動而後能達於外辨

仍從少陽而出傷寒十三日不解過經胸脇滿而嘔此少陽日晡所發潮熱陽明已而微利又現裏

實也先宜小柴胡湯以解外雖潮熱本屬少陽之後以柴胡加芒硝主之此以湯劑利之不應復以潮熱者

出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便硬脈細者此為陽微結陽氣不能隨經而散故鬱結不舒非必

有表復有裡也以上諸症有表有裏脈沈亦在裏也此沈者汗出為陽微為微假令純陰結不得復有外

證陰則此為半在裡半在表也汗出為表脈雖沈緊細即有不得為少陰病所以然者陰不得有汗此為

今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解得屎而不了了者以其有裏症故大便

之法即加芒硝及陽明病發潮熱大便溼小便自可胸脇滿而不去者小柴胡湯主之陽明潮熱不當

小便可則裏症未具又胸脇滿陽明病發潮熱大便溼小便自可胸脇滿而不去者小柴胡湯主之陽明潮熱不當

則和胃少陽與此湯和解之陽明病脇下硬滿症不大便下而嘔陽症舌上白胎者於陽明

故舌胎白雖不大便可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身微汗出而解也此四句申明小不可下此要訣也

此所以諸症得之皆愈也按少陽之外為太陽裏為陽明而少陽居其間故少陽之症有兼太陽陽者有兼陽明者內中見少陽一症即可用小柴胡湯必能兩顧得效仲景所以獨重此方也陽明

中風脈弦浮大弦屬少陽浮大屬陽明而短氣腹都滿脇下及心痛此少陽症久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥此症又

一身面目悉黃小便難此二症又有潮熱此似耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小柴

胡湯脈浮雖有裏症但浮無餘症者與麻黃湯但浮無餘症則裏症全無必從汗解故用麻黃湯此

麻黃總以脈症為若不尿膀胱氣絕腹滿加噦者不治論中陽明篇云陽明病不能食攻其熱必噦所以然者

憑無一定法也若不下汗出悌鬱復與之水以發其汗因得噦靈樞云真邪相攻氣并相逆故為本太陽病不解轉入

少陽者此為傳經之邪也脇下硬滿乾嘔不能食往來寒熱以上皆少陽本症尚未吐下脈沉緊者未吐下不經誤治也

浮而沈緊則弦之與小柴胡湯但發熱而非往來寒熱則與太陽陽太

陽病十日以去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯但浮者與麻黃湯解見麻

傷寒差以後更發熱者小柴胡主之此復症也非勞復非女勞復乃正氣不充餘邪未盡留在半表半裏

脈浮者以汗解之脈沉實者以下解之之問故亦用小柴胡復病治法明著於此後世議論不一皆非正法

之法不一醫者於麻黃桂枝及承氣大柴胡婦人中風七八日續得寒熱發作有時此即下成所經水

適斷者此為熱入血室其血必結血因熱結而成瘀矣故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之即以治瘧又云婦

人中風發熱惡寒經水適來彼云斷得之七八日熱除而脈遲身涼外伏胸脇下滿如結胸狀譏語者此

為熱入血室也血室為中焦榮氣之所聚肝藏血心主血榮血結當刺期門隨其實而瀉之期門在乳下

乳頭約四寸肝募也厥陰陰維之會刺入四分血結則為有形之症湯刺一時難效刺期門以瀉厥陰有餘之熱則尤親切而易散

又云婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血室晝清而夜昏者立室屬陰病在陰經也無犯胃氣及上二焦必自愈此為中焦榮氣之疾

汗下二法皆非所宜小柴胡湯刺期門則其治也按熱入血室之狀此二條為最詳婦人傷寒此症最多前條症稍輕後二條尤重男子亦有之

大柴胡湯二小柴胡去人參甘草加枳實芍藥大黃乃少陽陽明合治之方也

柴胡半斤 半夏半斤 黃芩三兩 芍藥三兩 生薑五兩 枳實四枚 大棗十二枚 右七味以水一斗二升煮取

六升再煎取三升溫服一升日三服 此方本有大黃二兩王叔和云若不加大黃恐不為大柴胡也

太陽病過經十餘日反二三下之一誤後二三日柴胡症仍在者如寒熱嘔逆之類先與小柴胡湯嘔不止心下

急鬱鬱微煩者猶有裏症為未解也與大柴胡湯下之則愈前雖已下非下法也傷寒十餘日熱結在裡大

黃之症復往來寒熱此柴胡對症與大柴胡湯 傷寒發熱汗出不解當用柴胡心中痞噎嘔吐而下利者枳實半

黃大此湯主之 傷寒後後者過經之後諸症漸輕而未全愈也脈沈沈者內實也沈為下解之宜大柴胡湯

柴胡加桂枝湯三此小柴胡與桂枝湯併為一方乃少陽太陽合病之方

柴胡四兩 黃芩 人參 桂枝 芍藥 生薑各一兩半 半夏二合 甘草一兩 大棗六枚 右

九味水七升煮取三升去渣溫服一升

傷寒六七日發熱微惡寒支節痠煩以上太陽微嘔心下支結以上少陽症外症未去者太陽症柴胡桂枝湯正

之發汗多亡陽譫語者此亡陽之不可下之謬語故以為戒與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自

愈桂枝湯和榮衛柴胡湯通津液深著二湯合用之功效而陽亡可復矣

柴胡加龍骨牡蠣湯四

柴胡 龍骨

生薑

人參

茯苓

鉛丹

黃芩

牡蠣

桂枝

各一兩半

半夏二合 大棗六枚 大黃二兩

右十二味以水八升煮取四升納大黃更煮一二沸大黃只煮一沸取其生

而流也去滓溫服一升

傷寒八九日下之即陷入裏胸滿柴胡煩驚龍骨小便不利茯苓譫語大一身盡重不能轉側者此湯主之

此乃正氣虛耗已入裏而復外擾三陽故現症錯雜藥亦隨症施治真神化無方者也按此方能下肝胆之驚痰以之治癰癰必效

柴胡桂枝乾薑湯五

柴胡半斤 桂枝三兩 乾薑

牡蠣熬

甘草各二兩

黃芩三兩

枳實根四兩

右七味以水一斗二

升煮取六升去渣再煎取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈即氣已深一時不能即出如蒸蒸而振發熱汗出而

解之類

傷寒五六日已發汗而復下之一誤胸脇滿用牡蠣微結小便不利渴以上皆少陽症而不嘔故去半但頭

汗出陽氣上逆往來寒熱用柴心下煩者黃芩此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主之

柴胡加芒硝湯六柴胡湯原方加芒硝分兩各不同

柴胡二兩十銖 黃芩

甘草炙

人參

生薑

各一兩半夏二十銖

大棗四枚

芒硝二兩

右八味以

水四升煮取二升去渣納芒硝更煮微沸分溫再服不解更作不解不大便也此藥劑之最輕者以

兩耳按大柴胡湯加大黃枳實乃合用小承氣也此加芒硝乃合用調胃承氣也皆少陽陽明同治之方

傷寒論類方

柴胡湯

傷寒十三日不解。胸脇滿而嘔。日晡所發潮熱。已而微痢。此本柴胡證。下之而不得利。今反利者。知醫以九藥下之。非其治也。潮熱者。實也。先宜小柴胡湯以解外。後以柴胡加芒硝湯主之。本單芒硝治六府積。所謂通因通用之法也。潮熱而利。則邪不傳結。故較之大柴胡症。用藥稍輕。

梔子湯類五

梔子鼓湯一

梔子枚十四

香豉四合

右二味水四升。先煮梔子得二升半。納豉煮取升半。去滓分為二服。溫進一

服得吐止後服。此劑分兩最小。凡發汗吐下後。諸法俱用。未必皆誤。而正氣已傷矣。虛煩不得眠。取因正氣不充。留於上焦。故陽氣擾動而不得眠也。若劇者。必反覆顛倒。心中懊憹。心中懊憹。心不得安也。梔子鼓湯吐之。此非汗下之所能除者。吐之而痰涎結。盡則不在經。而在肺胃之間。為有形之物。故必吐而出之。反覆顛倒。心中懊憹。厚發汗若下之。而煩熱

者。必反覆顛倒。心中懊憹。心中懊憹。心不得安也。梔子鼓湯吐之。此非汗下之所能除者。吐之而痰涎結。盡則不在經。而在肺胃之間。為有形之物。故必吐而出之。反覆顛倒。心中懊憹。厚發汗若下之。而煩熱

胸中窒者。煩熱且窒。較前虛。梔子鼓湯主之。傷寒五六日。大下之後。身熱不去。心中結痛者。未欲解也。外內之邪俱未解。梔子鼓湯主之。按胸中窒結痛。何以不用小陷胸湯。蓋小陷胸症乃心下痛。胸中在心

也。結痛更甚於窒矣。梔子鼓湯主之。按胸中窒結痛。何以不用小陷胸湯。蓋小陷胸症乃心下痛。胸中在心

但內外不失。豈毫即上下亦不踰分寸也。陽明病。脈浮而緊。咽燥口苦。胸滿而喘。發熱汗出。不惡寒。反惡熱。身重。非因誤治而得者。若發汗。則躁。心憤憤反譫語。汗多。若加燒針。必怵惕煩躁。不得眠。即前以

亡陽驚。若下之。則胃中空虛。客氣動。腸中懊憹。以前因用三法。未必合度。舌上胎者。此句乃要訣。舌上有

物而可用吐法。否則和。梔子鼓湯主之。陽明病下之。其外有熱。水盡。手足溫。不結胸。與實。心中懊憹。飢

尚未結。惡無物可吐也。梔子鼓湯主之。陽明病下之。其外有熱。水盡。手足溫。不結胸。與實。心中懊憹。飢

尚未結。惡無物可吐也。梔子鼓湯主之。陽明病下之。其外有熱。水盡。手足溫。不結胸。與實。心中懊憹。飢

尚未結。惡無物可吐也。梔子鼓湯主之。陽明病下之。其外有熱。水盡。手足溫。不結胸。與實。心中懊憹。飢

不能食傳結但頭汗出陽邪在上梔子豉湯主之。下利後更煩按之心下濡者濡者濕滯之象非空非痛也為虛煩也宜梔子豉湯。

梔子湯原方加甘草二兩。右三味以水四升。先煮梔子甘草取二升半。納豉煮取升半。分二服。溫進一服得吐便止。

梔子生薑豉湯三

梔子湯原方加生薑五兩。先煮梔子生薑餘俱如前法得吐止後服。

凡用梔子湯病人舊微溲者不可與服之。此服梔子湯之戒。按梔子清熱上焦之火與腸胃亦無大害。更洩。若少氣者梔子甘草豉湯主之。甘草能補中氣。若嘔者梔子生薑豉湯主之。此二條言凡遇當用梔子湯之。按無物為嘔有物為吐欲止其嘔反令其吐吐之而嘔反止真匪夷所思也。

梔子乾薑湯四

梔子十四枚乾薑二兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐止後服。

傷寒醫以丸藥大下之。下未必誤以丸藥大下則誤矣。身熱不去。外有微煩下後而煩。此湯主之。下後故用乾薑。

梔子厚朴枳實湯五

梔子十四枚

厚朴四兩枳實四枚水浸去蘖炒煮服法同前。

傷寒下後心煩。即微腹滿臥起不安者。煩而加之腹滿則臥起俱不。梔子厚朴湯主之。

梔子柏皮湯六

傷寒論類方

梔子湯

梔子^{十五枚}甘草^{一兩}黃柏^{二兩}

右三味以水四升煮取升半去滓分溫再服

傷寒身黃發熱者梔子柏皮湯主之

本草柏皮散藏府結熱黃疸

枳實梔子豉湯^七

枳實^{二枚}梔子^{十四枚}豉^{一升}

右三味以清漿水七升空煮之又一煮法漿水即淘米之泔水久貼味酸為佳取四升納枳實

梔子者取二升下豉更者五六沸去渣分溫再服覆令微似汗此不取吐

大病差後勞復者勞復乃病後之餘症枳實梔子湯主之勞復因病後氣虛邪氣又結於上焦其症不一

峻補之劑治勞復則病變百出矣若有宿食者加大黃如博棋子五六枚此指勞復之有宿食者治食復之法亦在其

梔子湯加減七方既不註定何經亦不專治誤總由汗吐下之後正氣已虛尚有痰涎滯氣聚結上焦亦

非汗下之所能除經所云在上者因而越之則不動經氣而正不重傷此為最便乃不易之法也古方梔

子皆生用故入口即吐後人作湯以梔子炒黑不復作吐全失用梔子之意然

承氣湯類六

大承氣湯

大黃^{四兩}酒洗厚朴^{半斤}去皮枳實^{五枚}芒硝^{三合}右四味以水一斗先煮厚朴枳實取五升去滓納大

黃者取二升去滓納硝更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服

傷寒若吐若下後不解症不大便五六日上至十餘日晡時發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發

則不識人循衣摸床惕而不安微喘直視以上皆陽明危症因吐下之後竭其中氣津液已者死強則陰氣尚存且能剋胃實當則氣血已枯矣然微者但發熱潮譫語者惡症大承氣湯主之若

一服利止後服。中病即止。陽明病譫語有潮熱反不能食者。客熱不消。胃中必有燥屎五六枚。若能食者但硬

爾。能食非真欲食。不過粥飲猶可入口耳。不宜大承氣湯下之。硬即可下。按燥屎當在腸中。令云胃中

下則在腸中已結者。即謂之燥屎。言胃則腸已該矣。汗出譫語者。以有燥屎在胃中。此為風也。陽明本自汗出。然亦有汗出者。表邪尚在。不汗出者。為火邪內結也。須下之。過經乃可下之。此時下之。若早。語言必亂。譫語以表虛裡實故也。下早則引

而裏實。下之則愈。宜大承氣湯。雖已誤下。然見譫語等症。則更下。之亦不因誤下而遂不復下也。二陽併病。同起者為合病。一經未罷。一經又病者為併病。太陽

陽症罷。但發潮熱。手足絛絛。汗出大便難。而譫語者。以上皆陽下之則愈。宜大承氣湯。陽明病下之心

中懊憹而煩。此乃下之未盡。胃中有燥屎者。可攻。別有現症。腹微滿。初頭硬後必溏。不可下也。則微滿

原故不若有燥屎者。宜大承氣湯。病人煩熱汗出則解。又如瘧狀。日晡所發熱者。屬陽明也。脈實者宜

可攻。下之。脈虛者。宜發汗下之。與大承氣湯。發汗宜桂枝湯。桂湯下。桂大下後六七日不大便。煩不解。腹

滿痛者。此有燥屎也。所以然者。本有宿食故也。惟有宿食故難大下。而燥屎終未盡。宜大承氣湯。病人不大便五六日。繞

臍痛。正在燥煩燥發作有時者。此有燥屎。故令不大便也。病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。喘

冒不能臥者。有燥屎也。喘言不臥。燥屎現症。宜大承氣湯。大便有難無易。所以乍宜大承氣湯。以上三條皆證

病二三日。脈弱無太陽柴胡症。煩燥心下硬。邪熱入裏。至四五日。又陽雖能食。以小承氣湯。少與微和之。不

用全方。祇通其胃氣而已。又用藥之一法。令小安至六日。以陽未除。與大承氣湯一升。亦不必用全方。古人用藥雖現症

大便六七日。小便少者。雖不能食。但初頭硬後必溏。未定成硬。小便利則水穀不攻之必溏。須小便利

屎定硬。乃可攻之。以下不宜下。又一法。宜大承氣湯。傷寒六七日。目中不了了。睛不和。皆陽盛無表裡

症在裏已結大便難身微熱者此為實也和結急下之宜大承氣湯陽明病此三字也

此重在汗多恐內熱甚而發汗不解腹滿痛者宜大承氣湯以腹滿且痛則實邪有微矣

承氣湯腹滿不減減不足言仍腹滿也當下之宜大承氣湯以上諸條舉當下之一二症即用下

明少陽合病必下利其脉不負者順也負者失也少陽屬本脉當弦緊陽明屬土脉當洪緩若少陽脉勝

順也少陰屬水跌陽屬土土能勝水則胃氣尚強故為順即此意但彼處乃手足厥冷之利故屬少陰此則屬少陽為異耳

也盛此為實邪故知有宿食當下之宜此湯寸口脉浮而大按之反澀尺中亦微而澀有食而反微

故知有宿食當下之宜大承氣湯少陰病得之二三日轉入陰口燥舌乾者急下之陽明傳陰腎

以保津液宜大承氣湯少陰病自利清水色純青純青則非寒邪乃肝邪入腎心下必痛口乾燥者二

大承氣湯下利三部脉皆平無外邪按之心下硬者實邪急下之宜大承氣湯下利脉遲而滑者內實

也利未欲止當下之宜大承氣湯下利不欲食者以有宿食故也傷食惡食凡禁口利當須下之宜大

承氣湯下利差後至其年月日復發者以病不盡故也當下之宜大承氣湯下利脉反滑當有所去

下之乃愈宜大承氣湯病腹中滿痛者此為實也當下之宜大承氣湯脈雙弦而遲者必

心下硬不和乘土脉大而緊者陽中有陰也大為陽緊為陰可以下之宜大承氣湯按以上七條見傷寒論可下條之內

小承氣湯大承氣去芒硝厚朴枳實亦減似指離症可下法不入六經治法中

大黃四兩厚朴二兩枳實三枚右三味以水四升煮取一升二合去渣分溫二服初服湯當更衣

大黃四兩厚朴二兩枳實三枚右三味以水四升煮取一升二合去渣分溫二服初服湯當更衣

不爾者盡飲之若更衣勿服

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者凡汗出者皆惡寒其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者以上皆內此外欲解不惡

可攻裏也手足濇然汗出者此大便已硬也四支為諸陽之本濇汗出陽氣已盛大承氣湯主之若汗

多微發熱惡寒者外未解也其熱未潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令

大泄下腹滿不通雖外未解亦可用小承氣此陽明病潮熱大便微硬者可與大承氣湯不硬者不可

與之潮熱而便不硬亦禁下若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯入腹中轉失氣者此有燥屎也

此以藥探又法乃可攻之若不轉失氣者此但初頭硬後必溼不可攻之攻之必脹滿不能食也和氣因止欲

飲水者與水則噦寒熱相爭則噦其後發熱者必大便復硬而少也重傷津液以小承氣湯和之仍用小承氣以不轉

失氣者慎不可攻也人再中前戒聖陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必硬硬則讞語由便

硬便硬由胃燥胃燥由汗出津液少層層相因病情顯著小承氣湯主之若一服讞語止更莫復服陽明病讞語發潮熱脉滑而疾

者小承氣主之因滑疾則易下因與小承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣勿更與之明

日不大便脉反微濡者裡虛也為難治攻之不應是為難治不可更與承氣也太陽病若吐若下若發汗後微

煩小便數大便因硬者因字當著服大便之硬由小便數之所致蓋吐下汗小承氣湯和之愈下利讞

語者有燥屎也利而仍讞語和火不因利而息則必有燥屎蓋燥屎不因下利而去也後醫見利則不損下豈知燥屎之不能自出乎

調胃承氣湯三

大黃四兩去皮甘草二兩炙芒硝半升右三味以水三升先煮大黃甘草取一升去滓納芒硝更上火

微煮令沸少溫服之。按此硝善解結熱之和。大承氣用之解已結之熱。和此方用之以解將結之熱。和其能調胃則全賴甘草也。

傷寒脉浮。自汗出。小便數。心煩微惡寒。脚攣急。反與桂枝湯。攻其表。此誤也。得之便厥。咽中乾。煩燥吐逆。

者。作甘草乾薑湯與之。以復其陽。若厥愈足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其脚即伸。若胃氣不和。譫語者。

少與調胃承氣湯。陰陽錯雜之症。多方以救之。必有餘。在胃故少與以和之。餘詳難方條。發汗後惡寒者。虛故也。不惡寒但熱者。實也。當

和胃氣。與調胃承氣湯。此以發汗後無他症。但現微寒微熱。故止作虛。實觀之。則安知非更有餘邪。將復變他症耶。太陽病未解。脈陰陽俱停。無停

字。疑似沈滯不起。即下微。字之義。寸為陽。尺為陰。先振慄。汗出乃解。陰陽爭而復和。但陽脉微者。先汗出而解。當發其陽。但陰脉微者。下之而

解。當和其陰。若欲下之。宜調胃承氣湯。按此微字。即上停字之意。與微弱不同。微弱則不當復汗下也。傷寒十三日不解。過經譫語者。以

有熱也。當以湯下之。即大小承氣之類。若小便利者。大便當硬。而反下利。脉調和者。此言下後之症。知醫以丸藥下之。非

其治也。下非誤下之法誤。若自下利者。脉當微厥。今反和者。知為內實也。調胃承氣湯主之。當下而下。非其法。餘邪未盡。仍宜更下。

太陽病。過經十餘日。心下溫溫欲吐。而胸中痛。大便反溼。腹微滿。鬱鬱微煩。以上皆類。先其時自極吐下

者。和氣乘虛而入。與調胃承氣湯。以瀉胃邪。若不爾者。不可與。未經吐下。則邪在半裏。不得用下法。但欲嘔。胸中痛。微溼者。此非柴胡

症。以嘔故知極吐下也。和氣乘虛而入。陽明病。不吐不下。心煩者。未經吐下。而心煩。中氣實也。可與調胃承氣湯。太陽病

三日。發汗不解。蒸蒸發熱者。屬胃也。外邪已解。內熱未清。此湯主之。傷寒吐後。腹脹滿者。已吐而胃中仍滿。則非越所能愈。復當下。

矣。與調胃承氣湯。

桃仁承氣湯四

桃仁五十個 大黃四兩 甘草二兩 桂枝二兩 芒硝二兩 右五味以水七升。煮取二升半。去滓納芒

硝更上火微沸下火先令溫服五合日三服當微利微利則僅通大便不必定下血也

太陽病不解熱結膀胱太陽之邪由經入腑其人如狂血自下下者愈膀胱多氣多血熱甚則血凝而上于心包故神昏而如狂血得熱而行故能自下則邪從

血出與陽明之下燥屎同其外不解者尚未可攻外不解而攻之則邪反陷入矣當先解外宜桂枝湯外解已但小腹急結者乃可攻

之宜桃核承氣湯小頭急結是蓄血現症按宜桂枝湯四字從金匱增入

抵當湯五

水蛭熬蝨蟲去翅足熬各三十六個大黃三兩酒浸桃仁去皮尖二十個右四味以水五升者取三升去渣溫服一升

不下再服

太陽病六七日經過表症仍在脉微而沉裏向反不結胸下其人發狂者以熱在下焦少腹當硬滿外小便自

利者內下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀血在裡故也抵當湯主之此亦熱結膀胱之症前桃核承氣乃治瘀血已結之後也

太陽病身黃脉沈結小腹硬小便不利者為無血也以上皆似血証因小便不利安知小便非瘀熱不行之故不可斷為有血也

自利其人如狂者血証諦也並無淫熱而如狂非蓄血如何如此審證無過形矣抵當湯主之陽明症其人喜忘者必有蓄血主

血凝則心氣結而失其官矣蓄不甚故不狂所以然者本有久瘀血故令喜忘此乃舊病非傷寒所得者也尿雖硬大便反易血性滑利其色必

黑浮血亦有隨便而下者宜抵當湯下之病人無表裡症發熱七八日經過雖脉浮數者可下之脉雖浮數而無表裏實矣七八日故可下假令已下脉數不解合熱則消穀善飢脉數不解和本不在大便也消穀善至六七日裏症則其發熱竟更久

不大便者有瘀血也宜抵當湯其脉數不解而下不止必協熱而使膿血也此指服湯後之變症熱邪不

便合為一而為便膿血之症又當別有治法按瘀血又有但欲漱水不欲嚥之症蓋唇口乾燥而腹中不能容水也

傷寒論類方 承氣湯

抵當丸六

水蛭熬

蝨蟲各二十個

大黃三兩酒洗桃仁三十五個去皮尖

右四味搗分為四丸以水一升煮一丸取七

合服時時也當下血不下更服時也

傷寒有數少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥宜抵當丸其而少腹滿又小便不利必兼三者乃為血證

諸不可餘藥謂此症須緩下其血用丸使之徐下

十棗湯七

芫花熬

甘遂

大戟等分

大棗十枚

右三味各別搗為散以水一升半先煮大棗肥者取八

合去滓納藥末強人服一錢七羸人服半錢得快下利後粥糜自養平日溫服若下少病不除者明日

更服

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發作有時頭痛心下痞硬滿引脇下痛水停乾嘔也

短氣汗出不惡寒者此表解裡未和也不惡寒為表解以上諸症皆裏不和凡蓄水之症皆如此不時傷寒為其也十棗湯主之服此湯以下蓄飲

大陷胸湯八

大黃六兩

芒硝一升

甘遂一錢

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓納芒硝煮一兩沸納甘

遂末溫服一升得快利止後服

太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解

也醫反下之經云病發於陽而反下之熱入因作結胸是也動數變遲正氣盛膈內拒痛胃中空虛虛氣動脇短氣煩燥心中懊憹

陽氣內陷。心下因硬。則為結胸。此段明所以致結胸之由。及結胸之狀。最詳。乃因和在上焦。若不結胸。但

頭汗出。餘處無汗。刺頸而還。小便不利。身必發黃也。此乃誤下而邪氣不陷。入上焦。反傷寒六七日。結胸

熱實。脉沉而緊。心下痛。按之石硬者。此段申明結胸。大陷胸湯主之。傷寒十餘日。經熱結在裡。復往來寒

熱者。與大柴胡湯。但結胸無大熱者。此為水結在胸脇也。結胸本無他物。但頭汗出者。與結

之。太陽病重發汗而復下之。不大便五六日。古上燥而渴。胸有日晡所小有潮熱。從心上至少腹硬滿

而痛。不可近者。此汗下而大痛如此。知非有物之實邪矣。前云脇內拒痛。又云心下石鞭。專指上焦。大陷

胸湯主之。傷寒五六日。嘔而發熱者。柴胡湯證具。而以他藥下之。譙柴胡證仍在者。復與柴胡湯。此雖

已下之。不為逆。必蒸蒸而振。却發熱汗出而解。却向裏而更虛。故汗出為難。若心下滿而硬痛者。此湯主之。

大陷胸丸

大黃半劬 葶藶子熬 芒硝 杏仁各半升去 右四味搗篩二味。納杏仁芒硝合研如脂。和散

取如彈丸一枚。別搗甘遂末一錢匕。白蜜二合。水二升。煮取一升。溫頓服之。一宿乃下。如不下。更服取

下為效。

病發於陽而反下之。熱入因作結胸病。發於陰而反下之。熱入因作痞。此明所以致結胸與痞之故。發熱

胸與熱惡寒之症。則熱入於陰位而作。所以成結胸者。以下之太早故也。二病未嘗不可下。但各

者項亦強。如柔瘕狀。此陷胸之外症。下之則和。宜大陷胸丸。

小陷胸湯

黃連一兩半夏半升括括蔓實一枚右三味以水六升。先煮括蔓取三升。去渣納諸藥煮二升。去渣

分溫三服。服未知再服微解。下黃涎便安也。按大承氣所下者燥屎大陷胸所下者蓄水此所下者

如此切

小結胸病正在心下。按之則痛。上不至心下不及少腹必按之方脈浮滑者。不若大陷胸症之沈小陷胸

湯主之。

白散十一

桔梗

貝母各三分古法二分巴豆一分去皮心黑研如脂

右三味為散。納巴豆更於臼中杵之。以白飲和

服。強人服半錢七。今秤約重三分。贏者減之。病在膈上必吐。在膈下必利。不利進熱粥一盃。利過不止進冷粥

一盃。巴豆得熱則止身熱皮栗不解欲引衣自覆者。若以水溼之洗之。益令熱卻不得出。當汗而

不汗則煩。假令汗出。腹中痛。與芍藥三兩如上法。

寒實結胸。結胸皆係熱陷之症此云寒實無熱症者。與三物小陷胸湯。白散亦可用。按活人書云與三物

可用七字蓋小陷胸寒劑非無熱之所宜也

麻仁丸十二即小承氣加

麻子仁二升芍藥

枳實各半大黃

厚朴

杏仁各一升去皮尖熱別研作脂

丸如梧桐子大。飲服十丸。漸加以知為度。

跌陽脈浮而濇。浮則胃氣強。濇則小便數。陰不浮濇相搏。大便則難。其脾為約。此即論中所云太陽麻

仁丸主之大陽正傳陽明不復再傳故可以緩法治之

瀉心湯類七

生薑瀉心湯一

生薑四兩甘草炙

人參

黃芩各三兩

半夏半升

黃連

乾薑各一兩

大棗十二枚

右八味以水

一斗煮取六升去渣煎取三升溫服一升日三服

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞硬乾噎食臍脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之研後

未盡必有留飲在心下其症甚雜而方中諸藥一一對症內中又有一藥治兩症者亦有兩藥合治一症者錯綜變化攻補兼施寒熱互用皆本內經立方諸法其藥性又有與神農本草所載無處不合學者能於此等方講求其理而推廣之則操縱在我矣凡瀉心諸法皆已汗已下已吐之餘疾

甘草瀉心湯二

即生薑瀉心湯去人參生薑加甘草一兩

甘草四兩黃芩

乾薑各三兩

半夏半升

黃連一兩

大棗十二枚

右六味以水一斗煮取六升去渣

再煎取三升溫服一升日三服

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不得安醫見心下

痞謂病不盡復下之其痞益甚此非熱結但以胃中虛兩次誤下故用甘草以補胃而痞自除俗醫以甘草滿中為痞嘔禁用之藥益不知虛實之義者也

客氣上逆故使硬也甘草瀉心湯主之

半夏瀉心湯三

半夏半升黃芩

乾薑

甘草炙

人參各三兩

黃連一兩

大棗十二枚

右七味以水一斗煮取

六升去渣再煎取三升溫服一升日三服

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯症具而以此他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆

必蒸蒸而振却發熱汗出而解本証仍在則即若心滿而不痛者此為痞又指不痛二字痞症尤的柴胡不中與之宜

半夏瀉心湯以上三瀉心之藥大半皆本於柴胡湯皆其所治之症多與柴胡症相同而加治虛痞痞之藥耳

大黃黃連瀉心湯四

大黃二兩黃連二兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去渣分溫再服此又法之最奇者不取

淡以滌上焦之邪

脉浮而緊而復下之緊反入裡則作痞緊脉為陰此所謂病發於陰下之作痞是也按之自濡但氣痞耳并無脇下之水心下痞按之

濡其關上浮者和或甚高大黃黃連瀉心湯主之傷寒大下後復發汗再誤心下痞惡寒者表未解也不可攻

痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜此湯詳見前桂枝類中

附子瀉心湯五

大黃二兩

酒浸黃連

黃芩妙各一兩

附子一枚去皮別煮取汁

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去渣

納附子汁分溫再服此法更精附子用前三味用泡枝陽欲其熱而性重開痞欲其生而性輕也

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之此條不過二語而妙理無窮前條發汗之後惡寒則用桂枝

表即未盡故先用桂枝以去表如此惡寒而仍汗出則亡陽在即故加入附子以回陽氣又彼後分二方此併一方者何也蓋彼有表復有裏此則祇有裏病故有分有合也

黃連湯六

即半夏瀉心湯去黃芩加桂枝

黃連 甘草炙 乾薑 桂枝去皮各三兩 人參二兩 半夏半升 大棗十二枚 右七味以水一斗煮

取六升去渣溫服一升日三夜二服治上焦之病故服藥宜少而數

傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之諸瀉心之法皆治心胃之間寒熱不調全屬裏症此方以黃芩易桂枝去瀉心之名而曰

黃連湯乃表邪尚有一分未盡胃中和氣尚當外達故加桂枝一味以和表裏則意無不到矣

黃芩湯

黃芩三兩 甘草炙 芍藥各二兩 大棗十二枚 右四味以水一斗煮取三升去渣溫服一升日再夜一服

黃芩加半夏生薑湯

黃芩三兩 甘草炙 芍藥各二兩 半夏半升 生薑三兩 大棗十二枚 右六味以水一斗煮取三升去渣

溫服一升日再夜一服

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之下利即專於治利不雜以風寒表藥此亦急當救裏之義若嘔

亦即兼以止嘔之藥總之見症施治服藥後而本症愈復見他症則仍見症施治可推而知也

乾薑黃連黃芩人參湯

乾薑 黃連 黃芩 人參各三兩 右四味以水六升煮取二升去渣分溫再服

傷寒本自寒下本症醫復吐下之誤治寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑黃連黃芩人參湯主之此屬厥陰條寒格自

用乾薑吐下自用芩連因誤治而虛其正氣則用人參分途而治無所不包又各不相礙古方之所以入化也

旋覆代赭湯

傷寒論類方 瀉心湯

旋覆花 三兩 人參 二兩 生薑 五兩 甘草 三兩 半夏 半升 代赭石 一兩 大棗 十二枚 右七味以水一斗

煮取六升去渣再煎取三升溫服一升日三服

傷寒發汗者吐若下解後病入治多未必皆屬誤治心下痞硬噎氣不除靈樞日問篇云寒氣客於胃厥逆從下上散

於中旋覆代赭湯主之此乃病已向愈中有流邪在於心胃之間與前諸瀉心法大約相近本草云旋覆

之故旋覆代赭湯主之治結氣腸下滿代赭治腹中邪毒氣加此二物以治噎餘則散痞補虛之法也

厚朴生薑甘草半夏人參湯十一
厚朴 半兩 生薑 半夏 甘草 二兩 人參 一兩 右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一

升日三服

發汗後腹脹滿者此湯主之發汗後則邪氣已去而猶腹脹滿乃虛邪入腹故以厚朴除脹滿餘則補虛助胃也

白虎湯類八

白虎湯一

知母 六兩 石膏 一觔 甘草 二兩 粳米 六合 右四味以水一斗煮米熟湯成候去滓溫服一升日三服

傷寒脈浮滑此表有熱裏有寒此寒熱二字必倒誤乃未有寒裏有熱也觀下條脈滑而 白虎

湯主之傷寒脈滑而厥者裏有熱也白虎湯主之三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢

識語遺尿以上皆陽明熱症之在經者以三陽統於陽明也但身重腹滿則似風溼宜用求附而垢 汗則識語陽從下之則額上生汗手足逆冷此脫若自汗者白虎湯主之

於外而欲上脫則用參附等藥以回之上焦之陽盛逼陰於外而欲上洩則用石膏以收之同一亡陽而治法迥殊細審之自明否則生死立判

白虎加人參湯二

白虎湯原方加人參三兩者服同前法

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解服此湯主之煩渴不解因汗多而胃液乾枯邪雖去而陽明之

不同總宜傷寒若吐若下後前汗後此七八日不解熱結在裡表裡俱熱此四字為時時惡風表邪未盡大渴

舌上乾燥而煩欲飲水數升者胃液已盡不在經不在腑亦非若承氣症之有實邪因胃口津此湯主之

傷寒無大熱喉在口燥渴心煩背微惡寒者此亦虛燥之症微惡寒謂雖惡寒而其微又周身不寒此湯

主之傷寒脉浮發熱無汗無汗二字最是表不解者惡不可與白虎湯渴飲水無表症者不惡白虎

加人參湯主之白虎加參湯大段治汗吐下之後邪已去而有留熱在於陽明又因胃液乾枯故用之

竹葉石膏湯三

竹葉二把石膏一觔半夏半升人參三兩麥門冬一升甘草二兩粳米半升右七味以水一斗煮

取六升去滓納粳米煮米熟湯成又法去米溫服一升日三服

傷寒解後虛羸少氣人參氣逆欲吐者半夏竹葉石膏湯主之此仲景先生治傷寒愈後調養之方也其

寒雖六經傳過而汗吐下三者皆肺胃當之又內經云人之傷於寒也則為病熱故滋養肺胃岐

五苓散類元

猪苓十八銖澤瀉一兩白朮十八銖茯苓十八銖桂枝半兩右五味為末以白飲和服方寸七日三服

傷寒論類方 白虎湯 五苓散

多飲暖水汗出愈。服散取其停胃胸中多飲暖水取其氣散榮衛

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利

微熱消渴者與五苓散主之。胃中乾而欲飲此無水也與水則愈小便不利而欲飲此蓄水也利水則愈同一渴而治法不同蓋由同一渴而渴之象及渴之餘症亦各不同也

發汗已脉浮數煩渴者五苓散主之。汗不盡則中風發熱六七日不解而煩有表裡證渴欲飲水水入

則吐者名曰水逆。胸中有水則五苓散主之四味治表餘多飲暖水汗出愈表裏俱到本以下之故心下痞

與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之。治痞而痞不解反渴則為太陽病十緩

關浮尺弱。皆為虛象其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也。誤如其不下者病人不惡寒而

渴者此轉屬陽明也。此屬實邪小便數者大便必硬不更衣十日無所苦也渴欲飲水者少與飲之但以瀉

之隨症施治不執一端渴者與五苓散。如其渴不止五霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之此亦表裏

同治之法

猪苓湯二

猪苓去皮茯苓 澤瀉 滑石碎 阿膠略一 右五味以水四升先煮四味取二升去滓納

阿膠洋消溫服七合日三服

陽明病若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之。此陽明之渴故與五苓相近而獨去桂枝恐陽

以胃中燥不可更利其小便也少陰病下利六七日咳而嘔渴心煩不得眠者此湯主之。此亦熱邪傳少陰之症益少

之法今止嘔渴則熱邪尚輕故用此

便熱邪從小便出其路尤近也

文蛤散三

文蛤五兩

右一味為散以沸湯和一方寸匕服湯用五合

病在陽應以汗解之反以冷水濕之若灌之其氣被劫不得去彌更益煩肉上粟起寒在裏中意欲飲水及不

渴者服文蛤散此熱結在皮膚肌肉之中不在胃口若不差者與五苓散裏同治

茯苓甘草湯四

茯苓二兩

桂枝二兩

甘草一兩

生薑三兩 右四味以水四升煮取二升分溫三服

傷寒汗出而渴者五苓散主之桂枝止汗餘四味止渴

不渴者茯苓甘草湯主之此方之義從未有能證釋者蓋汗出之後而渴不止與五苓人所易

知也乃汗出之後並無渴症又未指明別有何症忽無端而與茯苓甘草湯此意何居要知此處汗出二字乃發汗後汗出不止也汗出不止則亡陽在即當與以真武湯其稍輕者當與以茯苓桂枝白朮甘草

湯更輕者則與以此湯何以知之以此三方同用茯苓知之蓋汗大洩必引腎水上泛非茯苓不能鎮之故真武則佐以附子回陽此二方則以桂枝甘草飲汗而茯苓則皆以為主藥此方之義不丁然乎觀下條

心轉治法益明傷寒厥而下悸者宜先治水水犯心當服茯苓甘草湯本草茯苓治心却治其厥不瀕水漬

入胃必作利也

四逆湯類十

四逆湯一

甘草二兩

乾薑二兩

附子一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人可

大附子一枚常人則取中者可取乾薑三兩是也凡論中言脈沉微遲弱者則厥冷不待言而可知此方溫中

散寒故附子用生者四逆理中皆溫熱之劑而四逆一類絕不離乾薑以通陽也

傷寒論類方

四逆湯

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆

者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者

少與調胃承氣湯以上義詳難方條內若重發汗復加燒針者四逆湯主之陰陽兩虛之後又復竭其陽非此湯不能挽回陽氣傷寒醫下

之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裡後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂

枝湯說詳前桂枝條內病發熱頭痛表邪未解身疼痛者宜桂枝湯此乃脉反沈脉見裏若不差身體疼痛當救其裡宜四逆湯身疼痛痛陰陽二

而疼痛雖發熱亦是裏寒外熱之症故用四逆脈浮而遲表欲裏寒下利清穀者四逆湯主之自利不渴者屬太陰以

其藏有寒故也明所以不當溫之宜四逆輩有寒則不渴則知渴者皆當作熱治不曰四逆湯而曰四逆散凡溫熱之劑皆可選用少陰病脉沉

者急溫之病與脉相合則溫不可遲宜四逆湯少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐此二句指不食之時言此與少陽之

之以上者因而越之始得之手足寒脈弦遲者此胸中實始得言病方起脉弦不可下也欲吐則病在上當下之為逆當吐

之此少陰宜吐之若膈上有寒飲乾嘔者乾嘔與物則知其為飲矣不可吐也當溫之寒飲無實物吐之則寒散而飲亦去矣凡治飲皆用溫法

宜四逆湯大汗出熱不去內拘急四肢疼以上皆外症其又下利清穀逆而惡寒者三者皆虛寒內症四逆湯主

之按此條諸症皆屬陰寒固為易辨惟熱不去三字則安知非表邪未盡即惡寒亦安知非太陽未罷之惡寒惟下利厥逆則所謂急當救裏不論其有表無表而扶陽不可緩矣大汗若大

下利而厥冷者四逆湯主之汗下後而厥冷則虛寒極矣嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治亦外熱內虛寒之故四逆

湯主之吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之既吐且利小便復利而大汗出下

利清穀內寒外熱脉微欲絕者四逆湯主之以上五條皆係汗下之後陽氣大虛故雖外有微熱而總以扶陽為急大小便俱利則內陽亦盡矣不僅手足逆冷為陽

微也

四逆加人參湯二

四逆湯原方加人參二兩煎服法同

惡寒脉微而復利利止亡血也

按亡陰即為亡血不必真脫血也或無已註引金匱玉函曰水竭則無血謂利止則津液內竭四逆加人參湯主之加參以生津液

通脈四逆湯三

甘草二兩

乾薑三兩強人四兩附子一枚

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服其脈即出者

愈面色赤者加葱九莖

腹中痛者去葱加芍藥二兩嘔者加生薑二兩咽痛者去芍藥加桔

梗一兩利止脈不出者去桔梗加人參二兩補益津液

少陰病下利清穀裏寒外熱

寒通陽於外手足厥逆外症脉微欲絕內身反不惡寒寒邪入裏其人面色赤越陽或腹

痛或乾嘔或咽痛

陽升或利止脉不出者通脈四逆湯主之其脉即出者愈諸症或陽或陰乃閉塞不通之故用辛溫通陽之品以治之其

兼症不同詳加減法

下利清穀裡寒外熱汗出而厥者汗出而厥陽有立亡之象通脈四逆湯主之

通脈四逆加猪膽汁湯四

通脈四逆原方加猪膽汁半合煎如前法煎成納猪膽汁溫服其脈即出

猪膽汁苦滑之極引藥直達下焦

吐已下斷

利止也汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絕者通脈四逆加猪膽汁湯主之

乾薑附子湯五

乾薑二兩

附子一枚生用去皮切八片

右二味以水三升煮取一升去渣頓服

下之後復發汗

先竭其陰後竭其陽晝日煩躁不得眠夜而安靜陽虛有二症有喜陽者有畏陽者大抵陰亦虛者

傷寒論類方

四逆湯

也不嘔下渴無衣發脉沈微身無大熱者此中已退而陽氣未復故止用薑附回陽乾薑附子湯主之

乾薑附子湯原方加葱白四莖煎服法照前

少陰病下利白通湯主之此專治少陰之利用意白所以通少陰之陽氣

白通加猪膽汁湯七

白通湯原方加人尿五合猪膽汁一合右三味以水三升煮取一升去渣納膽汁人尿和令相得分

溫再服無膽汁亦可

少陰下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者此脉厥逆而且煩則上下俱不通陰陽相格故加猪膽人尿引陽藥達於至陰而通之內經

取之是也白通加猪膽汁湯主之服湯脉暴出者死微續者生暴出乃藥力所迫藥力盡則氣仍絕微續乃正氣自復故可生也少陰篇云

少陰病下利不止惡寒而踰臥手足溫者可治則又當以手足之溫驗其陽之有無也前云其脉即出者愈此云暴出者死蓋暴出與即出不同暴出一時出盡即出言服藥後少頃即徐徐微續也須善會之

茯苓四逆湯八

茯苓四兩一本人參一兩附子一枚甘草二兩乾薑一兩右五味以水五升煮取三升去滓溫服

七合日三服

發汗若下之病仍不解煩躁者此陽氣不攝而煩所謂陰煩也然亦茯苓四逆湯主之本草茯苓治逆氣煩滿

四逆散九

甘草炙枳實實紫胡胡芍藥右四味各十分搗篩白飲和服方寸匕日三服欬者加五

味子乾薑各五分并主下利。悸者加桂枝五分。小便不利者加茯苓五分。腹中痛者加附子一枝。炮令拆。泄利下重者先以水五升煮薤白取三升去渣以散方寸匕納湯中煮取一升半分溫再服。別錄薤白主腹溫中散結

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者。此乃少陰傳經之熱邪並無脈微惡寒等陰症即下利一端並非清穀而反下重故不四逆散主之。疎和通氣同名四逆與前諸得用溫熱法迥殊諸兼症皆在加減中

當歸四逆湯+

當歸 桂枝 芍藥 細辛各三甘草 通草各二大棗二十右七味以水八升煮取

三升溫服一升日三服

當歸四逆加吳茱萸生薑湯十一

當歸 甘草 通草各二芍藥 桂枝 細辛各三三棗二十吳茱萸二升生薑半勛

右九味以水六升清酒五升和煮取五升去渣分溫五服

手足厥寒脉細欲絕者當歸四逆湯主之。此四逆乃太陽傳經之邪而表症猶未罷因陽氣已虛若其人

內有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之。內有久寒指平素言必得間而得之或另有現症乃為

主於溫此二方則溫下利脉大者虛也。凡症虛而脉反大以其強下之故也推求所以設脉浮革辨脉法

中兼通陽和陰之法弦而大弦則為虛虛寒相搏此名為革因而腸鳴者通和之故屬當歸四逆湯主之

理中湯類十一

理中丸

人參 甘草 白朮 乾薑

各三兩

右四味搗篩為末蜜和為丸如雞子黃大以沸湯數合

和一丸研碎溫服之。日三四服。夜二服。腹中未熱。益至三四丸。然不及湯。理中丸與湯本屬一方方法以四物依

兩數切用水八升。煮取三升。去滓溫服。升。日三服。急則用湯若臍上築者。腎氣動也。去朮加桂四兩。即欲作奔豚

厥桂枝加吐多者。去朮加生薑二兩。有乾薑而復加生薑。下多者。還用朮。止利。悸者。加茯苓二兩。心下

有水故用茯苓。渴欲飲水者。加朮。足前成四兩半。消飲。腹中痛者。加人參。足前成四兩半。此痛因氣不足之故。別錄云。人參治心腹

痛寒者。加乾薑。足前成四兩半。腹滿者。去朮加附子一枚。此腹滿乃陽服湯後。如食頃飲熱粥一升許。

微自溫。勿揭衣被。此飲熱粥欲其助藥力以內溫。

霍亂頭痛發熱。身疼痛。論中又云。嘔吐而利。名曰霍亂。又云。頭痛則身疼。惡寒吐利。名曰霍亂。合觀之。則霍亂之症。始備益亦傷寒之類。後人以暑月之吐利當之。而亦用理中。更造為大

順散者。皆無稽之論也。熱多欲飲水者。五苓散主之。此熱勝寒。寒多不用水者。理中湯主之。此寒勝熱。之霍亂。按

氣不和。陰陽格。上下不通。水火不濟。之所致。五苓散所治之霍亂。霍亂之症。皆由寒熱之

當以丸藥理之。當錢治之宜理中丸。

真武湯

茯苓

芍藥

生薑

白朮

附子

右五味以水八升。煮取三升。去渣溫服七合。

日三服

若噉者。加五味子半升。細辛乾薑各二兩。若小便利者。去茯苓。若下利者。去芍藥。加乾

薑二兩

此即下利清穀之類。故去芍藥加乾薑。若噉者。去附子。加生薑。足前成半斤。

太陽病發汗。汗出不解。太陽病乃桂枝症也。其發汗當取微似汗。則衛氣泄而不傷榮。若發汗太過。動其

也。其人仍發熱。仍在心下悸。不足。隨陽而上。此頭眩身重。動振振欲墜地者。浮無依著。真武湯主之。

鎮伏腎水。挽回陽氣。少陰病。二三日不已。至四五日。腹痛。小便不利。四肢沈重。痠痛。自下利者。以上證此為有水

氣。水亦其人。或咳。或下利。或嘔者。此四症或有或無。真武湯主之。此方因發汗不合法。上焦之

腎氣治逆水不專為汗多亡陽而設。治亡陽之方。諸四逆湯乃正法也。

附子湯三

附子二枚 茯苓三兩 人參二兩 白朮四兩 芍藥三兩 右五味以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。

日三服

少陰病得之一二日。口中和。寒邪微。其背惡寒者。當灸之。但背惡寒則寒邪聚於一處。故用灸法。按白虎

溫熱何也。蓋惡寒既有微甚之不同。而其根反處全在口中。和與口燥。附子湯主之。此乃病已向愈。正氣

渴之過。別故欲知裏症之寒熱全在渴不渴辨之。此傷寒之要訣也。附子湯主之。此亦虛

甘草附子湯四

甘草二兩 白朮二兩 桂枝四兩 附子二兩 右五味以水六升。煮取三升。去渣。溫服一升。日三服。初

服得微汗則解。即服桂枝湯論中所云風溼發汗。汗大出者。但風氣去。溼氣在。是能食。汗出復煩者。有

餘邪。服五合。恐一升多者。服六七合為始。此言初服之始。

風溼相搏。骨節痠痛。掣痛不得屈伸。近之則痛。劇汗出。短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫者。此湯

主之此段形容風溼之狀病情畧備

桂枝附子湯五

桂枝四兩 附子三枚炮去八片 甘草二兩 生薑三兩 大棗十二枚 右五味以水六升煮取二升去滓分溫

三服按此即桂枝去芍藥加附子湯但彼桂枝用三兩附子用一枚以治下後脈促胸滿之症此桂枝加一兩附子加二枚以治風溼身疼脈浮濡之症一方而治病迥殊方亦各異彼編入桂枝湯類

此編入理中湯類細思之各當其理分兩之不可忽如此義亦猶矣後人何得以古方輕於加減也

桂枝附子去桂枝加白朮湯六

白朮四兩 甘草二兩 附子三枚炮 生薑三兩 大棗十二枚 右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

初服其人身如痺半日許復服之三服盡其人如冒狀勿怪此以附朮併走皮內逐水氣附朮併力則逐水之功愈

大未得除故使之耳法當加桂四兩此即前桂枝附子湯此木一方二法以大便硬小便自利去桂也以大便不

硬小便不利當加桂觀此條知桂枝能通小便故五苓散用之 附子三枚恐多也虛弱及產婦者宜減服之

傷寒八九日風溼相搏身體疼痛不能自轉側溼則身重不嘔不渴兼寒而 脈虛浮而澹者內外之陽俱虛 桂枝附子湯

主之若其人大便硬小便自利者去桂加白朮湯主之白朮生陽胃之津液

茯苓桂枝白朮甘草湯七

茯苓四兩 桂枝三兩 白朮各二兩 甘草各二兩 右四味以水六升煮取三升去渣分溫三服

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沈緊發汗則動經身為振振搖者此湯主之此亦陽虛而動

腎水之症即真武症之輕者故其法亦仿真武之意

芍藥甘草附子湯

芍藥

甘草

各三兩

附子

一枚炮去

皮破八片

右三味

以水五升煮取一升五合

去渣分溫三服

發汗病不解反惡寒者虛故也此湯主之

甘草附子加芍藥即有和陰之意亦邪之甚輕者

桂枝人參湯

桂枝

人參

各四兩

甘草

白朮

人參

乾薑

各三兩

右五味

以水九升

先煮四味

取五升

納桂更

煮取三升

桂獨後煮欲其治於裏症藥中越出於表以散其邪也

去渣溫服一升日再夜一服

大陽病外症未除而數下之早又太速協熱而利利下不止

邪氣心下痞硬邪在上焦表宜桂

表宜桂

裏宜四

不

解

桂枝人參湯主之

此必數下之後而現虛症故藥協熱而仍用溫補

雜法方類十二

赤石脂禹餘糧湯

論中有汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰疼與禹餘糧丸疑即此為丸

赤石脂

禹餘糧

各一

右二味

以水六升煮取二升

去滓分溫三服

二石同煎方中絕少

傷寒腹脹藥下利不止心下痞硬

腹脹

腹脹

腹脹

腹脹

腹脹

腹脹

腹脹

腹脹

腹脹

腹脹

腹脹

腹脹

者理中焦也此利在下焦

下藥太過則大腸受傷

赤石脂

禹餘糧

湯主之

以清脫復利不止當利其小便則便自堅

治脫

復利

不止

當利

其小

便則

便自堅

火甘草湯

又名復脈湯

甘草

四兩

生薑

三兩

人參

二兩

生地黃

一斤

桂枝

三兩

麥門冬

半斤

阿膠

二兩

麻仁

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去渣納膏烺消盡溫服一升日三服

傷寒脉結代。脉來緩而時一止復來曰結。脉來動而中止不能自還因而復動心動悸。心主脉脉之止息也。治傷寒邪盡之後氣血兩虛而經隧不通陰陽不交之故。心動悸皆心氣不虛之故也。活人書云陰盛則結陽盛則促。

甘草乾薑湯三

甘草四兩乾薑二兩

右二味以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

芍藥甘草湯四

芍藥四兩甘草四兩

右二味以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

傷寒脉浮有汗出小便數心煩微惡寒。以上俱似脚攣急裏虛之象只此一症決非桂枝症矣凡辨症必於獨異處著眼反與桂枝湯欲

攻其表此誤也得之便厥咽中乾燥煩吐逆者。有陽越作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更

作芍藥甘草湯與之其脚即伸。此湯乃純陰之劑以復其陰也陰陽兩和而脚伸矣若胃氣不和譫語者留邪在少與調胃承氣湯

若重發汗復加燒針者四逆湯主之。詳見四逆條下問曰證象陽旦。活人書云桂枝湯加黃芩曰陽旦成無已云即桂枝湯別名按法治

之而增劇厥逆咽中乾兩脰拘急而譫語。以上言按法用方而病不應手其故安在師言夜半手足當溫兩脚當伸後如師言

何以知之答曰寸口脉浮而大浮則為風大則為虛風則生微熱虛則兩脰攣病證象桂枝因加附子參

其間桂枝加湯增桂令汗出附子溫經亡陽故也。厥逆兩脰拘急即亡陽之兆厥逆咽中乾煩躁陽明內結陽越譫語煩

亂更飲甘草乾薑湯。陽納夜半陽氣還兩足當熱脰尚微拘急重與芍藥甘草湯以此養陰氣爾乃脚

伸以承氣湯微瀉則止其譫語。以條陽明所結之餘邪故知病可愈。病證象桂枝句以下應微治故以明用藥之次第當如此蓋病證既多斷無一方能治之理必

先分証而施方而其先後之序又不可亂其方有前後截然相反者亦不得以錯雜為嫌隨機應變神妙無方而又規矩不亂故天下無不可愈之疾後人欲以一方治諸症又無一味中病之藥嗚呼難哉

茵陳蒿湯五

茵陳蒿六兩 梔子十四枚 大黃二兩

右三味以水一斗先煮茵陳減六升茵陳為主藥納三味煮取三升

去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減病從小便去也先煮茵陳則大黃從小便出此法也

陽明病發熱汗出者此為熱越不能發黃也但頭汗出者身無汗齋頸而還小便不利渴欲飲水者此為

瘧熱在裡身必發黃茵陳湯主之本草茵陳主熱結黃疸傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者陽明用

茵陳湯主之

麻黃連軀赤小豆湯六

麻黃二兩 連軀二兩 赤小豆一升 生梓白皮一升 杏仁四十枚 甘草二兩 生薑一兩 大棗十二枚 右八

味以潦一斗無根之水先煮麻黃再沸去上沫納諸藥煮取三升去滓分溫三服半日服盡連軀即連翹根氣味相近

今人不採即以連翹代可也

傷寒瘧熱在裡身必發黃此湯主之前方欲黃從下解此方欲黃從汗解乃有表無表之分也

麻黃升麻湯七

麻黃二兩 升麻一兩 當歸一分 知母一分 黃芩一分 姜豉各十銖 白朮八銖 石膏二兩 乾薑一分

芍藥二兩 天冬一分 桂枝一分 茯苓一分 甘草六銖 右十四味以水一斗先煮麻黃二兩沸去上

沫納諸藥煮取三升去滓分溫三服相去如炊三斗米頃令盡汗出愈

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者皆上熱下寒之症為難

治此湯主之

此乃傷寒壞症寒熱互見上下兩傷故藥亦照症施治病之難藥味之多古方所僅見觀此可悟古人用藥之法

瓜蒂散

瓜蒂散黃赤小豆各一

右二味各別搗節為散已合治之取一錢匕以香豉一合用熱湯七合煮

作稀糜去渣和散溫頓服不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與之

非專引吐此方則專於引吐而已

病如桂枝症頭不痛項不强脉微浮胸中痞硬氣上衝咽喉不得息者此為胸中有寒也寒飲當吐之

在上者宜瓜蒂散本草瓜蒂病在胸腹中皆吐下之

病人手足厥冷脉下緊者邪結在胸中所以陽氣不通心中滿而煩飢

不能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂散

吳茱萸湯

吳茱萸一升人參三兩

生薑六兩

太棗十二枚

右四味以水七升煮取二升去渣溫服七合日三服

食穀欲嘔者必食穀而嘔受病在納

屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也

少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

此胃氣虛寒之症乾嘔吐涎沫亦云乾嘔者謂不必食穀

而亦頭痛者上於頭之脉

吳茱萸湯主之

此胃中有寒飲之症

黃連阿膠湯

黃連四兩

黃芩一兩

芍藥二兩

阿膠三兩

雞子黃二枚

右五味以水六升煮三物取二升去渣納

膠烱盡小冷納雞子黃

小冷而納雞子黃則不至凝結而相和

攪令相得溫服七合日三服

少陰病得之二三日以心中煩不得臥此湯主之此少陰傳經之熱和擾動少陰之氣故以降火養陰為治而以雞子黃引藥下達

赤石脂一斤一斗全 乾薑二兩 粳米一升

溫服七合三服若一服愈餘勿服兼末服取其

少陰病下利便膿血裏熱下利則大腸血與下利清穀絕不同

腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之

半夏散及湯十二

半夏洗 桂枝去皮 甘草炙

能散服者以水一升煎七沸納散兩方寸匕更煎三沸下火令小冷少少嚥之治上之藥

少陰病咽中痛足少陰之脉循喉咽扶舌本

猪膚湯十三

猪膚一斤 右一味以水一斗煮取五升去渣加白蜜一升白粉五合糯米熬香和令相得溫分六服

少陰病下利咽痛胸滿心煩者此亦中焦氣虛陰火上炎之症猪膚湯主之以甘草

甘草湯十四

甘草二兩 右一味以水三升煮取一升五合去渣溫服七合日二服

桔梗湯十五

桔梗二兩 甘草二兩

右二味以水三升者取一升去渣分溫再服

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯

大甘為土之正味能制腎水越上之火

不差與桔梗湯

佐以辛苦開散之品別錄云瘰癧咽痛

苦酒湯十六

半夏十四

雞子一升

去黃

右二味納半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令三沸

此等煮法必有深意疑即

古所云禁方也去渣少少含嚥之不差更作三劑

少陰病咽中傷生瘡

疑即陰火喉痺之類

不能言語聲不出者苦酒湯主之

咽中生瘡此必遷延病久咽喉為火所蒸腐此非湯劑之所能療用此藥能火

障氣內治而兼外治法也

烏梅丸十七

烏梅二百

細辛六兩

乾薑十兩

當歸四兩

黃連一斤

附子六兩

炮

蜀椒四兩

去汗

桂枝六兩

人參六兩

黃檗六兩

右十味異搗篩合治之以苦酒浸烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥令相得納臼中與蜜杵二千下丸如梧桐子大先食飲服十九日三服稍加至二十丸禁生冷滑物臭食等

傷寒脈微而厥至七八日膚冷不衛其人躁無暫晏時者此為藏厥此症非蛇厥也蛇厥者其人當吐蛇

令病者靜而復時煩此為藏寒蛇上入其膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蛇聞食臭出其人當自吐

蛇厥者烏梅丸主之又主久痢

此治久痢之聖方也其能治蛇諸藥之性當於神農本草中細審辨諸方盡然不復一一具載

白頭翁湯十八

白頭翁二兩

黃連

黃檗

秦皮各三兩

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈更

服一升

熱利下重者白頭翁湯主之。凡下重皆屬於熱下利欲飲水者以有熱故也白頭翁湯主之

牡蠣澤瀉散十九

牡蠣澤瀉 蜀漆洗去 括蕞根 葶藶子 高陸根洗去 海藻洗去 右七味異

搗下篩為散更入白中杵之白飲和服方寸匕小便利止後服

大病差後從腰以下有水氣者牡蠣澤瀉散主之。此治水病之主方

蜜煎導方二十

蜜七合 右一味於銅器內微火煎凝如飴狀攪之勿令焦灼候可丸併手捻作錠令頭銳大如指

長二寸許當數時急作冷則硬以納穀道中以手急抱欲大便時乃去之

猪膽汁方廿一

大猪膽一枚 洗淨汁和醋少許以灌穀道中如食頃當大便出宿食惡物甚效

陽明病自汗出若發汗小便利者此乃津液內竭雖硬不可攻之當須自欲大便。須待也言必待其自欲大便而後用此法

宜蜜煎導而通之若土瓜根及大猪膽汁皆可為導

燒視散廿二

右取婦人中視近陰處煎燒灰以水和服方寸匕日三服小便利即利陰頭微腫則愈婦人病取男子視

當燒反其如火從陰處出也

傷寒陰陽易之為病。其方愈而文按則其人身體重小氣少腹裡急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒視散主之。

六經脉症

欲讀傷寒論必先識六經之本證。然後論中所稱太陽陽明等病。其源流變態形色脉象當一一備記了。然於心。然後其証之分併疑似及用藥加減異同之故可以曉然。不致眩惑貽誤。故備錄於左。

太陽病。脉浮頭項強痛而惡寒。尺寸俱浮者太陽受病也。其脉上連風府。故頭項痛腰脊強。發熱汗

出惡風脉緩者。名曰中風。惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊者。名曰傷寒。發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡

寒者。發於陰也。發於陽者七日愈。發於陰者六日愈。以陽數七陰數六也。陽明中風口苦咽乾腹滿微

喘發熱惡寒脉浮而緊。惡寒未離太陽也。陽明病若能食名中風不能食名中寒。尺寸俱長者陽明受病也。

其脉使鼻絡於目。故身熱目疼鼻乾不得臥。陽明外證身熱汗自出不惡寒反惡熱也。陽明脉大以

皆陽明之經病。有太陽陽明有正陽陽明有小陽陽明。太陽陽明者脾約是也。少陽陽明者發汗利小便

已胃中燥煩實大便難是也。陽明之為病胃家實也。此乃正陽陽明。陽明居中土也。萬物所歸無所復傳。始

雖惡寒三日自止。此為陽明病也。少陽之為病口苦舌乾目眩也。尺寸俱弦者少陽受病也。其脉循

脇絡於耳。故胸脇痛而耳聾。少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下。吐下則悸而驚。

傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽。三陽合病脉浮大上關上但欲眠睡目合則汗。內熱已極。傷寒六七日

無大熱。外熱輕則。其人煩燥者此為陽去入陰也。傷寒三日三陽為盡三陰當受邪。其人反能食而不

嘔此為三陰不受邪也 太陰之為病腹滿而吐食不下自利甚時腹自痛 尺寸俱沈細者太陰受病也其脉布胃中終於噎故腹滿而噎乾 傷寒脉浮而緩手足自溫者繫在太陰 自利不渴者屬太陰以藏有寒故也當溫之宜服四逆輩此自利不渴寒在中焦也 少陰之為病脉微細但欲寐也行於陽則寤行於陰則寐 少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也 尺寸俱沈者少陰受病也以其脉貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴 厥陰之為病消渴氣上撞心中夜熱肌而不欲食食則吐蛔下之利不止 尺寸俱微緩者厥陰受病也以其脉循陰器絡於肝故煩滿而囊縮 厥陰中風脉微浮為欲愈不浮為未愈

別症變症附刺法

傷寒本症之外有別症有變症別症者其病與傷寒相類而實非傷寒是也變症者傷寒本不當有此遷延時日或因雜藥誤投其病變態百出是也其症不備則必驚疑消惑而無所措手故備錄之庶不致臨症傍徨

藏結 冷結 除中 伏氣 晚發 瘕 溼 風溼 溼溫 溫毒

暍 陰毒 陽毒 溫病 熱病 兩感 風溫 溫疫 腳氣 多眠

狐惑 百合 藏厥 尸厥規刺

藏結

藏結如結胸狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉小細沈緊名曰藏結古上白胎滑者難治 藏結無陽

症其人反靜舌上胎滑者不可攻也。病脇下素有痞連在臍旁痛引小腹入陰經者。此名藏結死。

藏結與結胸皆下後邪氣乘虛入裏所致熱多與陽明相結為結胸寒多與陰相結為藏結故所現脈症皆為陰象舌上胎滑則上焦亦寒全無陽象故曰難治曰不可攻然猶有治法至素有痞疾則中氣已傷連及臍旁少腹并入陰經則上下俱病陰極陽竭不死何待

冷結

病者手足厥冷言我不結胸小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也

除中

傷寒脉遲七日而反與黃芩湯微其熱脉遲為寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除中必死微則為效效則吐逆下之則效止而利因不利不休則胸中如蟲蟻搏入則出小便不利兩脇拘急喘息為難頸背相引臂則不仁極寒反汗出身冷若冰眼睛不慧語言不休而數氣多入此為除中口雖欲言言不得前傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能食今反能食恐為除中治法無

伏氣

伏氣之病以意候之今月之內欲有伏氣假令舊有伏氣當須脉之若脉微弱當喉中痛似傷寒非喉痺也病人云實咽中痛雖爾今復欲下利活人書云伏氣之病謂非時有暴寒中人伏於少陰經始不竟病也病人云實咽中痛雖爾今復欲下利活人書云伏氣之病謂非時有暴寒中人伏於少陰經始不竟病也

晚發

用半夏桂枝甘草湯主之次四逆散主之此病只二日便差方謂之晚發也甘草半夏桂枝心等分每服四錢七八生薑四斤煎放冷少少含嚥之

脈陰陽俱緊至於吐利其脈獨不解緊去人安此為欲解若脈遲至六七日不欲食此為晚發水停故也為未解食自可者為欲解活人書傷寒病三

症

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛症金匱治剛症用葛根湯大承氣湯湯俱見前太陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔症

柔症用桂枝湯桂枝湯即桂枝湯加芍藥根二兩太陽病發汗太多因致症太陽病發熱脈沉而細者名曰症此言病身熱

足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤赤獨頭暈口噤背反張者症病也此言症象

溼

太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名溼痺之候其人小便不利大便反快但當利其小便溼家之為病一身盡疼發熱身色如薰黃溼家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死溼家下之其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則噦胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胸中有寒渴欲得水而不能飲則口燥煩也溼家病身上疲痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒溼故鼻塞內藥鼻中則愈

風溼

問曰風溼相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之不愈者何也答曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲汗出者風濕俱去也此言病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也風濕脈浮肢體

痛重不可轉側額上微汗不欲去或身微腫

濕溫

兩脛逆冷胸腹滿多汗頭目痛苦妄言其脈陽濡而弱陰小而急不可發汗治在太陰見活人書

溫毒

冬時觸冒疹毒至春始發肌肉發斑癰疹如錦紋或咳嗽心悶但嘔清汁見活人書

暍

太陽中暍者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也太陽中暍者身熱疼重而脈微弱此亦夏月傷冷水水行皮中所致也太陽中暍者發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細孔遲小便已灑灑然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥者發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚

陰毒

手足厥冷背強臍腹築痛咽痛短氣嘔吐下利身如被杖或冷汗煩渴或甲指面色青黑煩躁而渴脈沈細欲絕而一息七至至宜灸氣海丹田三百壯或葱熨臍中氣海在臍下一寸五分丹田在臍下二寸

陽毒

發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑若錦紋或下利赤黃脈洪實滑促或古卷焦黑鼻中如煙煤宜用布漬冷水搭於胸上蒸熱數換活人書法

溫病

冬時受寒藏於肌膚至春而發

熱病

寒氣至夏而發俱與傷寒相似

兩感

太陽與少陰陽明與太陰少陽與厥陰

風溫

其人素傷於風因復傷熱其脈尺寸俱浮頭疼身熱常自汗出體重而喘四肢不收嘿嘿但欲眠發汗則譫語煩躁狀若驚癇

溫疫

一歲之中男女老少之疾相似其狀不一

腳氣

頭痛身熱肢體痛大便秘嘔逆脚屈弱

多眠

有風溫症有少陰症有小柴胡症有狐惑症

狐惑

此症治法詳金匱

狀如傷寒或傷寒後變症默默欲眠目不能開不欲飲食面目乍白乍赤黑虫食其睛為惑其聲啞蝕

其肝為狐其咽乾爛見五臟則死當視其唇上唇有瘡蟲食其臟下唇有瘡蟲食其肝多因下利而得濕
屢之病亦相似

百合此証詳金匱治法亦備

此亦傷寒變症百脈一宗悉致其病百脈一宗乃肺病也故金匱用百合治之其狀欲食復不能食默默欲臥復不能臥欲行復不能行飲食或有美時或有惡聞其時如寒無寒如熱無熱小便赤藥入口即吐如有神靈者

刺法

古聖人治病之法針灸為先靈藥所論皆為針灸而設即治傷寒亦皆用針刺熱病篇所載是也至仲
景專以湯劑治傷寒尤為變化神妙然亦有湯劑所必不能愈而必用刺者仲景亦不能舍此而為治
後人豈可不知故另考明諸穴以附於後

尸厥

少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胸膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令
身不仁此為尸厥當刺期門巨闕見平脈法

期門二穴在第二肋端不容穴傍各一寸五分上直兩乳足太陰厥陰陰維之會舉臂取之刺入四分
灸五壯肝募也巨闕一穴在鳩尾下一寸任脈氣所發刺入六分留七呼灸五壯心募也

傷寒腹滿譫語寸口脈浮而緊此肝乘脾也名曰縱刺期門縱者起其所勝故縱不收也傷寒發熱畜畜惡寒大渴
欲飲水其腹必滿自汗出小便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫刺期門橫者犯其所不勝橫連犯上也刺期門時所以洩肝之盛氣期


門穴見前 太陽與少陽併病。頭項強痛。或眩冒時如結胸。心下痞硬者。當刺大椎第一間。肺俞。肝俞。慎不可發汗。發汗則譫語。脉弦五六日譫語不止。刺期門。

大椎一穴。在第一椎陷者中。三陽督脈之會。刺入五分。灸九壯。肺俞二穴。在第三椎下。兩旁各一寸五分。刺入三分。留七呼。灸三壯。

太陽少陽併病。心下硬。頸項強而眩者。當刺大椎。肺俞。肝俞。慎勿下之。陽明病下血。譫語者。此為熱入血室。但頭汗出者。刺期門。隨其熱而瀉之。澌然汗出者愈。此男子熱入血室之症。婦人亦見之。見小柴胡條下。 凡治溫病。可刺五

十九穴。

內經熱俞五十。九頭上五行行五者。以越諸陽之熱逆也。大杼。膺俞。缺盆。背俞。此八者。以瀉胸中之熱也。氣衝。三里。巨虛。上下廉。此八者。以瀉胃中之熱也。雲門。髃骨。委中。髓空。此八者。以瀉四支之熱也。五臟俞旁五。此十者。以瀉五臟之熱也。凡此五十九穴者。皆熱之左右也。



H873784
1907
V. 4